

## **Salonpas tapasz**

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását szakirodalmi adatok igazolják.

### **Mi a hatóanyaga?**

6,29 g metil-szalicilát (methylis salicylas), 5,71 g mentol (L-mentholum), 1,24 g kámfor (DL-camphora), 2,00 g tokoferol-acetát (tocopheroli acetas) 100 g készítményben.

### **Mit tartalmaz még a tapasz?**

A tapasz segédanyagai: nyersgumi, hidrogénezett gyanta-glicerínészter, almasavas gyanta-glicerínészter, polibutilén, poli-izobutilén, cinkoxid, kolloid szilíciumdioxid, titándioxid, dibutil-hidroxitoluol, keményítő-akrilát, illatanyag.

### **Mikor ajánlott a Salonpas tapasz alkalmazása?**

Izületi fájdalom, zúzódások, ficamok, rándulások, derékfájdalom, fagyások, vállmerevség okozta fájdalom enyhítésére.

### **Mikor nem szabad a Salonpas tapaszt alkalmazni?**

Bármely alkotórészeivel szembeni allergia esetén, veseelégtelenségben ellenjavallt. Allergiás hajlam és szalicilát túlérzékenység esetén tájékoztassa orvosát. Hosszan tartó, nagy felületen való alkalmazása különösen károsodott perifériás keringés esetén, vagy cukorbetegség végtagjain kerüendő.

### **Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?**

A készítmény kizárólag sértetlen, ép bőrfelületen alkalmazható.

### **Alkalmazhatják-e a készítményt gyermekek is?**

Csak 12 éves életkorkor feletti gyermekeknél alkalmazható.

### **Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel ?**

Nem alkalmazható a készítmény szájon át szedhető véralvadásgátló gyógyszerekkel együtt. Nagy felületen, nagy adagban történő alkalmazása során a methotrexat toxicitása és a szulfonil-karbamid tartalmú gyógyszerek vércukorszint-csökkentő hatása felerősödhet.

Fokozhatja más, helyileg alkalmazott gyógyszer hatását, ezért ne használja a Salonpas tapaszt együtt egyéb helyi alkalmazású készítménnyel.

Más gyógyszerekkel való együttes alkalmazás esetén kérje ki kezelő orvosa tanácsát!

### **Mit kell megfontolni várandósság és szoptatás ideje alatt?**

Ezen élethelyzetekben a tapasz használata hosszabb ideig, nagy felületen nem javasolt. Szoptató anyáknál a mellen és környékén nem szabad alkalmazni.

### **Hogyan kell használni a Salonpas tapaszt?**

Távolítsa el a tapasz hátoldalán lévő védőfilmet. Helyezze rá az előzetesen megtisztított és száraz kezelendő bőrfelületre és enyhén simítsa rá. Naponta legfeljebb háromszor cserélheti a tapaszt, de 8 óránál tovább ne maradjon a bőrön.

### **Milyen nem kívánt hatást válthat ki a tapasz?**

Ritkán bőrpír, viszketés és allergiás bőrkiütés előfordulhat, ebben az esetben hagyja abba a tapaszkezelést. Amennyiben a kellemetlen tünetek nem múlnak el, úgy keresse fel orvosát.

**Mire kell még ügyelnie a tapasz alkalmazása során?**

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!

Szembe, nyálkahártyára nem kerülhet.

Érzékeny bőrű egyén először egy kis tapaszdarabbal végezzen érzékenységi próbát; ragassza a tapasz-darabot a karjára (pl. könyök belső hajlat) kb. 60 percre. Amennyiben a bőrfelületen kiütés, viszketés vagy a bőrfelület piros elszíneződése következik be, ne folytassa a kezelést

A tapaszt a lejárati időn belül lehet felhasználni.

**Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?**

Ha tünetei 7 napos kezelés után is fennállnak vagy néhány nap múlva kiújulnak, hagyja abba a kezelést és keresse fel kezelőorvosát.

**Hogyan kell tárolni a tapaszt?**

Legfeljebb 25 °C-on, nedvességtől, fénytől védve

**Csomagolási egység:** 20 db (65 mm x 42 mm)  
2 db (130 mm x 84 mm)

**Nyilvántartási szám:** OGYI-802/2000

**Gyártó/Forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.  
408, Tashiro-Daikanmachi, Tosu, Saga, Japán

**Magyarországon forgalmazza:** Sager Pharma Kft  
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.